

استاندارد ملی بذر پیاز

استاندارد مزرعه پیاز دگرگرده افشان

عنوان استاندارد	سوپر الیت	مادری	گواهی شده
حداقل تناوب (سال) *	۲	۲	۱
حداقل فاصله ایزولاسیون (متر)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰
حداکثر بوته سایر ارقام	۰	۲/۱۰۰۰	۵/۱۰۰۰
حداکثر بوته علف های هرز	***	***	***
آفات			
Myzus persicae, Aceria tulipae	***	***	***
بیماری های بذر زاد (درصد)			
Onion mosaic virus : ویروس	۰	۰	۱
قارچها ****:	۰/۱	۰/۵	۱
<i>Fusarium spp.</i> <i>Peronospora destructor</i>	۰/۱	۰/۱	۰/۵
نماتد:	۰/۱	۰/۱	۰/۵
<i>Ditylenchus dipsaci</i>	۰/۱	۰/۱	۰/۵

- * توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وحینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.
- ** در صورت بالا بودن شدت آلودگی به آفات در مزرعه، بایستی طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات عمل گردد.
- *** با توجه به آلودگی به Pink Rot بایستی مزرعه آلوده مورد کاشت قرار نگیرد.
- **** دو عامل بیماری قارچی به نامهای *Fusarium oxysporium* و *F.solani* باید مورد آزمایش قرار گیرند.
- سلکسیون سوخ: (الف) خارج از تیپ نباشد. به لحاظ مرفولوژی بر اساس دیسکریپتور (ب) اندازه ۳۰ تا ۵۰ میلی متر سوخ (ج) قطر گردن کاملاً نازک باشد. (د) دوقلو نباشد.

استاندارد بذر پیاز

عنوان استاندارد	سوپر الیت	مادری	گواهی شده
حداقل خلوص فیزیکی(در صد)	۹۸	۹۸	۹۸
حداکثر مواد جامد(در صد)	۲	۲	۲
حداکثر تعداد بذر سایر محصولات	۰	۵/۱۰۰۰	۱۰/۱۰۰۰
بذر سایر ارقام	-	-	-
حداقل قوه نامیه(درصد)	۷۰	۷۰	۷۰
حداکثر رطوبت بذر (درصد)	۸	۸	۸
حداکثر تعداد بذر علف های هرز *	۰	۱۰/۱۰۰۰۰	۱/۲۵۰۰
بیماری های بذر زاد (درصد)	-	-	-
ویروس : <i>Onion mosaic virus</i>	-	-	-
قارچها ****:	-	-	-
<i>Fusarium spp.</i> <i>Peronospora destructor</i>	۰/۱	۰/۱	۰/۱

* برای بذر تولید داخل برای طبقه گواهی شده ۳ عدد بذر علف هرز در نمونه کاری ۸ گرم برای بذر وارداتی تعداد ۱ عدد بذر علف هرز در نمونه کاری ۸ گرم

** دو عامل بیماری قارچی به نامهای *Fusarium oxysporium* و *F.solani* باید مورد آزمایش قرار گیرند.