

## استاندارد ملی بذر تربچه

استاندارد مزرعه تربچه

عنوان استاندارد	سوپر الیت	مادری	گواهی شده
حداقل تناوب (سال)	۴	۲	۲
حداقل فاصله ایزولاسیون (متر)			
برای تولید ریشه	۵	۵	۵
برای تولید بذر	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
حداکثر بوته سایر ارقام	۱/۲۰۰۰	۱/۱۰۰۰	۱/۵۰۰
حداکثر بوته علف های هرز	*	*	*
آفات			
Brevicoryne brassicae ، Myzus persicae	**	**	**
بیماری های بذر زاد (درصد)			
ویروس ***:	۰	۰/۱	۰/۵
<i>Culiflower mosaic</i> <i>Turnip mosaic</i>			
قارچها: <i>Rhizoctonia solani</i>	۰/۵	۱	۵
نماتد:			
<i>Heterodera schachtii</i>	۰/۱	۰/۱	۰/۵

\* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد.  
 \*\* در صورت وجود بیماریهای ویروسی در منطقه در کلاسهای سوپر الیت و مادری، ضدعفونی بذر بایستی طبق توصیه سازمان حفظ نباتات صورت می گیرد.

هسته اولیه بایستی دارای مشخصه های ثبت شده باشد

کاربرد علف کش بسیار نادر است و گیاهان دائمی مشکل ساز هستند و سایر گیاهان یکساله در وجین حذف می شوند.

استاندارد بذر تربچه

عنوان استاندارد	سوپر الیت	مادری	گواهی شده
حداقل خلوص فیزیکی (در صد)	۹۸	۹۸	۹۸
حداکثر مواد جامد (در صد)	۲	۲	۲
حداکثر تعداد بذر سایر محصولات	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱
بذر سایر ارقام	۰/۰۵	۰/۱	۰/۲۵
حداقل قوه نامیه (درصد)	۸۰	۸۰	۸۰
حداکثر رطوبت بذر (درصد)	۸	۸	۸
حداکثر تعداد بذر علف های هرز (در کیلوگرم)	۰	۱۰	۲۰
بیماری های بذر زاد (درصد)			
ویروس ***:			
<i>Culiflower mosaic</i>	-	-	-
<i>Turnip mosaic</i>			
قارچها: <i>Rhizoctonia solani</i>	-	-	-

\* در خصوص بذرهای دانه ای و هیبرید استاندارد خلوص فیزیکی ۱۰۰٪ و قوه نامیه ۹۵٪