

## استاندارد ملی بذر شلغم

استاندارد مزرعه تولید بذر شلغم

گواهی شده	مادری	سوپر الیت	
۲	۲	۴	حداقل تناوب (سال)
			حداقل فاصله ایزولاسیون (متر)
۵	۵	۵	برای تولید ریشه
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	برای تولید بذر
۲/۱۰۰۰	۱/۱۰۰۰	۱/۲۰۰۰	حداکثر بوته سایر ارقام (درصد)
*	*	*	حداکثر بوته علف های هرز
**	**	**	آفات
			بیماریهای بذرزاد (درصد)
۰/۵	۰/۱	۰	<i>Turnip mosaic virus</i> <i>Turnip yellow mosaic virus</i> ویروس ها
۱	۰/۵	۰/۱	<i>Xanthomonas campestris</i> <i>pv.campestris</i> پروکاریوت ها
۱	۰/۵	۰/۱	<i>Fusarium oxysporum</i> <i>Alternaria brassica</i> قارچ ها
۰/۵	۰/۱	۰/۱	نماتد

\* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعه به سهولت می باشد. تعداد بذر علفهای هرز هم خانواده از ۵ عدد بیشتر نباشد.

\*\* در صورت وجود بیماریهای ویروسی در منطقه در کلاسهای سوپر الیت و مادری ضدعفونی بذر با حشره کش توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات ضروری و در کلاس گواهی شده اختیاری است.

استاندارد بذر شلغم

گواهی شده	مادری	سوپر البیت	
۹۸	۹۸	۹۸	حداقل خلوص فیزیکی (درصد)
٪۲	٪۲	٪۲	حداکثر مواد جامد (درصد)
۰/۱	۰/۱	۰/۰۵	بذر سایر محصولات (درصد)
۰/۲۵	۰/۱	۰/۰۵	حداکثر بذر سایر ارقام (درصد)
۷۰	۷۰	۷۰	حداکثر تعداد بذر علف های هرز در کیلوگرم
۶	۶	۶	حداقل قوه نامیه (درصد)
۲۰	۱۰	۰	حداکثر رطوبت بذر(درصد)
			بیماریهای بذرزاد (درصد)
-	-	-	<i>Turnip mosaic virus</i> <i>Turnip yellow mosaic virus</i> ویروس ها
۰/۵	۰/۱	۰/۰۵	<i>Xanthomonas campestris</i> <i>pv.campestris</i> پروکاریوت ها
۰/۵	۰/۱	۰/۱	<i>Fusarium oxysporum</i> <i>Alternaria brassica</i> قارچ ها